

جامعة ديالى / كلية التربية الأساسية  
المادة / علم النفس ذوي الاحتياجات الخاصة  
المحاضرة / الاولى ، الوقت ٢ سا  
المرحلة الثانية  
قسم / الارشاد النفسي والتوجيه التربوي

## مفاهيم وقضايا أساسية في التربية الخاصة

لعل أول سؤال يتطرق إلى ذهن القارئ حديث الاطلاع على قضايا هذه الفئة من الأفراد غير العاديين هو : من هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأطفال الغير العاديين لذلك سوف يتم في بداية هذه المحاضرة توضيح ما هو مقصود بهذه الفئة من الأفراد كما سوف يتم توضيح بعض المصطلحات ذات العلاقة بهذه الفئة من الأفراد .

### الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة او ( الأطفال غير العاديين )

لقد أطلق على هذه الفئة من الأفراد عدد من المصطلحات لوصفهم كأفراد يختلفون عن الطلبة العاديين والذين يحتاجون إلى الخدمات التربوية الخاصة الآنه يمكننا وضع التعريف المبسط الآتي والذي يوضح المقصود بهذه الفئة من الأطفال (( يشير مصطلح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة او الأطفال الغير عاديين الى تلك الفئة من الأطفال الذين ينحرفون انحرافاً ملحوظاً ) عن المتوسط العام للأفراد العاديين في نموهم العقلي والحسي والانفعالي والحركي واللغوي ، مما يستدعي اهتماماً خاصاً ) من المربيين بهذه الفئة من حيث طرائق تشخيصهم ودفع البرامج التربوية واختيار طرائق التدريس الملائمة لهم

### التربية الخاصة Special Education

هي مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم لفئات من الأفراد غير العاديين ، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ، ومساعدتهم في التكيف .

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة :

### الإعاقة العقلية Mental Impairment

انخفاض ملحوظ في مستوى القدرات العقلية العامة ( درجة ذكاء تقل عن ٧٠ ) وعجز في السلوك التكيفي ( عدم القدرة على الأداء المستقل أو تحمل المسؤولية ومن هم في نفس العمر والمجموعة الثقافية )

## **الإعاقة البصرية Visual Impairment**

ضعف بصري شديد حتى بعد تصحيح الوضع جراحياً أو بالعدسات مما يحد من قدرة الطفل على التعلم عبر حاسة البصر بالأساليب التعليمية الاعتيادية

## **الإعاقة السمعية Hearing Impairment**

فقدان سمعي يؤثر بشكل ملحوظ على استخدام حاسة السمع للتواصل مع الآخرين وللتعلم من خلال الأساليب التربوية العادلة

## **الإعاقة الانفعالية Emotional Impairment**

انحراف السلوك من حيث تكراره أو مدته أو شكله أو شدته مما يعتبر سلوكاً عادياً مما يجعل الطفل بحاجة إلى أساليب تربوية خاصة

## **الإعاقة الحركية Motor Impairment**

اضطرابات شديدة عصبية أو عضلية – عظمية أو أمراض مزمنة تفرض قيوداً وضيقية على إمكانية تعلم الطفل

## **صعوبات التعلم Learning Disabilities**

اضطراب في العمليات النفسية الأساسية

(الانتباه ، التذكر ، التفكير ، الإدراك) الالازمة لاستخدام اللغة أو فهمها أو تعلم القراءة والكتابة والحساب

## **اضطرابات النطق أو اللغة Speech Language**

اضطراب ملحوظ في النطق أو الصوت أو الطلاقة أو التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية الأمر الذي يجعل الطفل بحاجة إلى برامج علاجية وتربيوية خاصة

## **التوحد Autism**

حالة تصيب الأطفال قبل (٣٦ شهراً) وتجعلهم غير قادرين على تكوين علاقات اجتماعية طبيعية وغير قادرين على تطوير مهارات التواصل

## **الموهبة والتقوّق Giftedness**

قدرات أدائية عالية ومتميزة في المجالات المعرفية والإبداعية والفنية والقيادية أو في مجالات أكاديمية محددة

الاعقة العقلية

## ما هي الاعاقة العقلية؟

-توجد ثلاثة معايير يمكن الحكم من خلالها على الشخص ما إذا كان مختلف عقلياً أم لا، وتشتمل الثلاثة معايير على التالي:

-مستوى وظائف المخ، وتتمثل في معامل الذكاء (IQ) والذي يكون تحت 70-75.

-قصور في اثنين أو أكثر من المهارات التي يقوم بها الشخص يومياً.

-التصرف بالسلوك الطفولية والتي توقف عند سن ١٨ أو أقل من ذلك .

## \*ما هي المهارات اليومية الازمة للإنسان؟

هي المهارات التي يحتاجها الشخص لممارسة حياته اليومية لكي يعمل ويلعب أو يعيش بشكل أعم في مجتمعه. وتتضمن هذه المهارات أيضاً على وسائل الاتصال والتعامل مع الغير، الاعتناء بالنفس، الحياة اليومية في المنزل، الاستمتاع والتمتع بالحياة، الصحة والأمان، توجيه النفس، الوظائف الأكاديمية (القراءة – الكتابة – أساسيات الرياضة .).

وتقييم مهارات الشخص في مقابل جميع خطوات الحياة التي يمر بها للحكم عليه، لكن الشخص الذي يعاني من قصور في الوظائف العقلية وليس لديه قصور في المهارات اليومية لا تشخيص حالته على أنها تخلف عقلي.

## \*مدى تأثير الاعاقة العقلية:

نجد أن هذا المرض شائع جداً ويُفوق نسب الإصابة بالشلل الدماغي بحوالي ١٠ مرات، وبحوالى ٢٨ مرة عن تشوّهات القناة العصبية مثل عدم اكتمال ال الفقرات القطنية "Spina Bifida" وبحوالى ٢٥ مرة عن إصابة العمى. ويحدث لأى فرد بغض النظر عن الفروق العرقية - الاقتصادية - الاجتماعية - التعليمية، ونسبة حدوثه ١ : ١٠ وتحتّل نسبة تأثير كل فرد بأعراضه تماماً مثل اختلاف

قدرات كل فرد عن الآخر. ويتأثر حوالي ٨٧ % من الأشخاص بشكل معتدل حيث تكون القدرة على اكتساب معلومات أو مهارات جديدة بشكل أبطأ قليلاً عن المعدل المتوسط. وبالنسبة للأطفال لا تتضح هذه الإعاقة في سن ما قبل المدرسة حتى يتم الالتحاق بها وتجد نسبة من الكبار يستطيعون الاعتماد على أنفسهم والحياة بشكل طبيعي إلى حد لا يمكن تصنيفهم تحت أي نوع من أنواع الإعاقة العقلية أما النسبة المتبقية ١٣ % والذي يكون معامل الذكاء للأشخاص فيها تحت ٥٠ (آي . كيو I ) "Q" والتي تمثل قصوراً حاداً في أكثر من وظيفة في جسم الإنسان، لكن مع التدخل المبكر يمكن تحسين مستوى الوظائف المختلفة.

#### \*تشخيص الإعاقة العقلية

- يتم تشخيص الإعاقة العقلية علي ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى :

إجراء اختبارات الذكاء القياسي، واختبارات المهارات .

- المرحلة الثانية :

- وصف نقاط ضعف الفرد وفقاً لأربعة أبعاد:

- المهارات العقلية والسلوكية .

- اعتبارات نفسية وعاطفية .

- اعتبارات بيئية .

- اعتبارات جسدية/متعلقة بالصحة/أسباب مرضية.

- وتحدد نقاط الضعف أو القوة بإحدى الطرق التالية:

- الاختبار .

- الملاحظة .

- مقابلة الأشخاص الذين يلعبون دوراً رئيسياً في حياة الشخص المعاق .

- التحدث مع الشخص المعاق نفسه .

-التفاعل مع الشخص في حياته اليومية .

-المرحلة الثالثة:

-تحديد قدر ما يحتاجه الفرد من مساعدة بواسطة أفراد متخصصين، وقد يحتاج الشخص إحدى درجات المساعدة الأربع التالية:

-مساعدة مؤقتة:

وهي المساعدة التي تتم عند الاحتياج لها عندما يطلبها الشخص ليس بشكل مستمر (مثل المساعدة في العثور على وظيفة جديدة .)

-مساعدة محدودة:

وهي التي تتم لوقت محدد من الزمن، مثل المرحلة الانتقالية ما بين المدرسة للعمل، أو عند التدريب علي وظيفة ما .

-مساعدة دائمة:

وهي عكس المساعدة المؤقتة والمحدودة فهي لا ترتبط بالحاجة أو بوقت معين، وتتم على أساس يومي في المنزل والعمل، لكن الثلاثة أنواع هذه في نفس الوقت من الممكن ألا يحتاجها الشخص في كافة مجالات الحياة حتى وإن كانت بشكل يومي ومستمر .

-مساعدة عامة:

وهي مساعدة تتم بشكل مطرد ثابت يومياً وفي كافة مجالات الحياة.  
ما هو العمر العقلي؟

"العمر العقلي" هو مصطلح يستخدم في اختبارات الذكاء لقياس معامل الذكاء وهل ما إذا كان الشخص يصدر ردود أفعاله بما يتاسب مع المقاييس التي يصدرها الشخص الطبيعي في نفس السن أم لا، والخطأ الشائع استخدام هذا المصطلح عند إصدار الحكم على الشخص المعاقد في تصرفاته اليومية والتي تبدو أصغر من سنه حيث لا يجب استخدامها خارج نطاق معامل الذكاء .

## \*أسباب الإصابة بالاعاقة العقلية

يصاب الشخص بالتأخر العقلي منذ الصغر أى أنها إعاقة لا تستجد في الكبر وتحدث لأى سبب يعيق نمو المخ بشكل طبيعي قبل الميلاد أو خلال عملية الولادة أو في سنوات الطفولة المبكرة. وقد تم اكتشاف العديد من مئات الأسباب، ولكن فى حوالى ٣/١ الحالات لم يتم التوصل للأسباب.

\*وتوجد ثلاثة أمراض رئيسية للتخلُّف العقلي:

- البله المغولي "متلازمة داون" Dawn Syndrome

٢- "Fetal Alcohol Syndrome"

"٣- خلل في كروموسومات" Fragile X-Syndrome

•تصنف الأسباب على النحو التالي:

- أسباب جينية:

وتنتج من خلل ما في الجينات التي يورثها الآباء، أو خلل في التكوين الجيني، أو أية اضطرابات في الجينات تنتج خلال فترة الحمل عند التعرض لعدوى أو من التعرض الزائد عن الحد للأشعة السينية (إكس) أو عوامل أخرى، وأكثر من ٥٠٠ مريض يرتبط التخلف العقلي عندهم بالسبب الجيني. ومن الأمثلة الشائعة حيث يحدث خلل في جين واحد فقط يؤدي إلى تعطل في التمثيل الغذائي للطفل قبل ميلاده نتيجة لخلل في إحدى الإنزيمات. ويسبب في متلازمة داون خلل في الكروموسومات في معظمها أو بعضاً منها أو نتيجة لتغير في هيكل الكروموسومات. أما بالنسبة (Fragile X-syndrome) (يأتى نتيجة لخلل في كروموسومات (X) مما يؤدي إلى وراثته والإصابة بالتأخر العقلي .

- ٢- مشاكل أثناء الحمل:

من الممكن أن يسبب تناول الكحوليات أثناء الحمل هذه الإعاقة أو إساءة استخدام

العقاقير، إلى جانب التدخين أيضاً، سوء التغذية، التلوث البيئي، إصابة الأم بمرض ما أثناء الحمل ( توكسوبلازموزيز - الزهرى - الحصبة الألمانية - سيتو ميجالوفيرس). كما أن الأم المصابة بفيروس (HIV) المسبب لمرض الأيدز ينتقل إلى جنينها أو يصاب بتلف في الجهاز العصبي بعد ولادته.

#### -٣- مشاكل أثناء الولادة:

- وأسبابها تتحصر في:

-أى ضغط على الطفل بشكل غير طبيعي أثناء ولادته يؤثر على مخ الطفل ويسبب به إصابات .

-الولادة قبل الميعاد المحدد .

-نقص في وزن الطفل .

وهذه هي الحالات التي تتبع أكثر عن غيرها باحتمالية الإصابة بالتخلف العقلي.

#### -٤- مشاكل بعد الولادة:

-الإصابة بالأمراض التالية:

-السعال الديكي .

-الجدري .

-الحصبة .

-إنفلونزا الهيب والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بمرض التهاب السحاياـ) الحمى الشوكية (واللادماغية (انعدام الدماغ) والتي تحدث تلف بالغ في المخ .

-التعرض للحوادث وإصابة الرأس فيها .

-التعرض للغرق .

-التسمم بالرصاص أو الزئبق أو أية سموم بيئية أخرى .

#### -٥- الفقر وضعف المستوى الثقافي:

تكون أطفال الأسر الفقيرة أكثر عرضة للإصابة بالتخلف العقلي ويرجع ذلك إلى سوء التغذية، توافر الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الأمراض، عدم توفير العناية أو الرعاية الطبية، التعرض لمخاطر صحية بيئية. كما أن هذه الأسر لا ينالها لأطفالهم نلقى قدرًا ملائماً من التوعية التي قد تتوافر للأخرين في المجتمعات المتحضرة.

\* هل يمكن منع الإصابة بالتخلف العقلي؟

في خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، أظهرت نتائج الأبحاث التي تم أجراوها تقدماً ملحوظاً في منع الإصابة بالتخلف العقلي، عن طريق منع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة:

١- منع الخل الذي يحدث في التمثيل الغذائي والذي يعرف باسم (Phenyl) ، وذلك عن طريق عمل فحص واختبارات للأطفال حديثي الولادة وباتباع نظام غذائي معين .

٢- منع الإصابة بنقص في الغدة الدرقية (Congenital Hypothyroidism) عن طريق فحص الطفل حديث الولادة وعن طريق العلاج بإحلال بدائل هرمون الغدة الدرقية.

٣- عن طريق استخدام مضادات (Anti-RH Immue Globulin) لمنع الإصابة (R H) والإصابة بالصفراء الحادة في الأطفال حديثي الولادة .

- ٤ التطعيم بفاكسين الهيب لمنع الإصابة بأنفلونزا هيب .

- ٥ التطعيم بفاكسين الهيب لمنع الإصابة بالحصبة.

- ٦- التطعيم بفاكسين الحصبة الألماني (روبيلا) لمنع الإصابة بها أثناء الحمل .
- ٧- التخلص من الرصاص الموجود في البيئة حيث يعمل على تلف المخ لدى الأطفال .
- ٨- استخدام الطرق الوقائية لمنع إصابة الأطفال مثل أحزمة الأمان في السيارات، خوازة الموتوسيكلات أو العجل .
- ٩- العناية المبكرة في مرحلة ما قبل الولادة أثناء فترة الحمل تساهم في الوقاية بدرجة كبيرة من العديد من الأمراض، مثل علاج الأم الحامل بـ (A Z T) لوقاية جنينها من الإصابة بمرض الإيدز إذا كانت حاملاً لهذا المرض، العناية بالنظام الغذائي مثل الفوليك أسييد (والذي يقلل من مخاطر الإصابة بتشوهات القناة العصبية .
- ١٠- وهناك العديد من الأبحاث للتوصيل إلى العقاقير التي تعالج الجينات التي يوجد بها خلل عند الطفل الصغير .

