

## المحاضرة الخامسة

التصنيف العام للطحالب :

هناك عدة نظم تصنيفية للطحالب قديمة وحديثة ولكن التصنيف المتبوع من قبل كثير من الباحثين هو وضع الطحالب ضمن (٨ شعب) هي :-

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Division: Cyanophyta</b>   | ١ - شعبة: الطحالب الخضر المزرقة         |
| <b>Division: Chlorophyta</b>  | ٢ - شعبة: الطحالب الخضر                 |
| <b>Division: Euglenophyta</b> | ٣ - شعبة: الطحالب اليوغنية              |
| <b>Division: Pyrrophyta</b>   | ٤ - شعبة: الطحالب البيروفاتية (البروات) |
| <b>Division: Chrysophyta</b>  | ٥ - شعبة: الطحالب الذهبية               |
| <b>Division: Cryptophyta</b>  | ٦ - شعبة: الطحالب الكربتية (الكربيات)   |
| <b>Division: Phaeophyta</b>   | ٧ - شعبة: الطحالب البنية                |
| <b>Division Rhodophyta</b>    | ٨ - شعبة الطحالب الحمر                  |

Classification Scheme of the Different Algal Groups

Kingdom	Division	Class
<b>Prokaryota eubacteria</b>	<b>Cyanophyta</b>	Cyanophyceae
	<b>Prochlorophyta</b>	Prochlorophyceae
	<b>Glaucophyta</b>	Glaucophyceae
	<b>Rhodophyta</b>	Bangiophyceae Florideophyceae
	<b>Heterokontophyta</b>	Chrysophyceae Xanthophyceae Eustigmatophyceae Bacillariophyceae Raphidophyceae Dictyochophyceae Phaeophyceae
	<b>Haptophyta</b>	Haptophyceae

	<b>Cryptophyta</b>	Cryptophyceae
Eukaryota	<b>Dinophyta</b>	Dinophyceae
	<b>Euglenophyta</b>	Euglenophyceae
	<b>Chlorarachniophyta</b>	Chlorarachniophyceae
	<b>Chlorophyta</b>	Prasinophyceae Chlorophyceae Ulvophyceae Cladophorophyceae Bryopsidophyceae Zygnematophyceae Trentepohliophyceae Klebsormidiophyceae Charophyceae Dasycladophyceae

## ١ – الطحالب الخضر المزرقة **Division Cyanophyta**

تسمى ايضا Cyanochlorena والطحالب الهلامية Myxophyta وذلك لكونها محاطة بغمد جيلاتيني ، وتدعى من قبل بعض العلماء بالبكتيريا الخضراء المزرقة Cyanobacteria ، وذلك لوجود بعض اوجه التشابه بين افراد هذه الشعبة وبين البكتيريا ومنها :-

- ١ – تكون افراد كلتا المجموعتين بدائية النواة
- ٢ – تكون فاقدة الاسواط
- ٣ – لا تحوي على اعضاء تكاثر جنسية ولا يحدث فيها التكاثر الجنسي  
لذا وضعت في التصنيف الحديث للممالك الحياتية مع البكتيريا في مملكة الابتدائيات .

### البيئة والتواجد :

تنتشر افراد هذه الشعبة في مختلف البيئات المائية والיבسة :

- ١ - تتوارد بعضها في المياه البحرية بصورة هائمة او ملتصقة
- ٢ - قد تعطي بعض الانواع الصفة المميزة لاماكن تواجدها كما في حالة البحر الاحمر والذي يعود سبب تسميته الى وجود الطحالب الاخضر المزرق *Trichodesmium* باعداد كبيرة وظهوره بلون الاحمر لتواجده بعيدا عن السطح .
- ٣ - يتواجد البعض منها في المياه الملوثة بالمواد العضوية وبذلك تعتبر دلائل على تلوث المياه بالمواد العضوية منها انواع من طحالب *Oscillatoria* وطحالب *Spirulina* وطحالب *Merismopedia*
- ٤ - البعض منها يعتبر مسبب لظاهرة (ازدهار الماء water bloom) : وتمثل هذه الظاهرة بالزيادة السريعة والمفاجئة في اعداد نوع او اكثر من هذه الطحالب في المياه وقد تحدث هذه الظاهرة فصليا او في فترات متقطعة ومن مسببات حدوث هذه الظاهرة هو توفر المغذيات وعوامل بيئية اخرى ومن الانواع المسببة لهذه الظاهرة *Anabaena* , *Microcystis*
- ٥ - شخصت بعض الانواع في مياه الينابيع الكبريتية الساخنة والتي تتراوح درجة حرارتها بين (٥٠-٧٣) ( وقد تقوم هذه الطحالب بترسب املاح الكالسيوم والمنيسيوم بشكل طبقات ملونة فوق اجسامها وتدعى Travertine )
- ٦ - شخصت بعض الانواع في المناطق القطبية على الثلوج .
- ٧ - تتوارد بعض الانواع في حقول النفط .
- ٨ - تتوارد بعض الانواع على اليابسة بشكل كتل جيلاتينية على التربة الرطبة او على جذوع او قلف الاشجار .
- ٩ - بعضها يتواجد في حالة تعايشية داخل اجسام بعض النباتات كما في طحالب *Nostoc* الذي يتواجد في حالة تعايشية داخل جسم النبات الحزاز *Anthoceros*
- ١٠ - تعد هذه الطحالب من اقدم المجاميع الطحلبية التي وجدت على سطح الكرة الارضية ويقدر عمرها باكثر من (٢٥٠٠) مليون سنة .

### **الصفات المميزة:**

- ١ - تكون بدائية النواة Prokaryote.
- ٢ - تفتقر الى وجود العضيات الخلوية.
- ٣ - الصبغات المتواجدة على صفائح البناء الضوئي تتمثل بالصبغات التالية:
  - Zeaxanthin , Myxoxanthin ,  $\beta$ -Carotine , Chl.a والمتمثلة بالصبغة الخضراء المزرقة C-phycocyanin والصبغة الخضراء المزرقة المساعدة C-Allophycerthrin .
  - C-phycoerthrin والصبغة الحمراء Allophycocyanin

- ٤ - يخزن الغذاء بشكل نشا من نوع Cyanophycean starch وهو عبارة عن مركبات كاربوهيدراتية شبيهة بالكلايكوجين الحيواني بالإضافة إلى بروتينات ودهون .
- ٥ - يحاط الجدار الخلوي في غالبية الاجناس بمادة جيلاتينية بشكل غلاف خارجي وقد يكون شفاف ورقيق او ملون او سميك .
- ٦ - تفتقر إلى وجود الاسواط او الاهداب .
- ٧ - تفتقر إلى وجود الاعضاء التكاثرية الجنسية ولم يلاحظ فيها التكاثر الجنسي.

**الشكل الخضري:**

تضم الطحالب الخضر المزرقة اشكال خضرية متعددة فالبعض منها احادية الخلية او متعددة الخلايا بشكل مستعمرات او تجمعات منتظمة وغير منتظمة او تكون خيطية بسيطة او متفرعة متفرعة كاذب او متفرع حقيقي (شكل ١٣ ، ١٤) .

## **التركيب الخلوي :**

تظهر خلية الطحالب الاخضر المزرق تحت المجهر الضوئي وهي محاطة بجدار خلوي وطبقه خارجية من مادة جيلاتينية شفافة ورقيقة او سميكه وملونة اما البروتوبلاست فيتميز الى منطقتين :

(١)منطقة خارجية ملونة تدعى Chromoplast .

(٢)منطقة داخلية مركبة تكون حبيبية غير ملونة تدعى Centroplast وقد يلاحظ في البروتوبلاست في بعض الانواع الهائمة فجوات كاذبة او غازية Gas vacuole تظهر بلون اسود تحت المجهر الضوئي . (شكل رقم ١٥ أ) في التركيب الخلوي الدقيق وكما يظهر تحت المجهر الالكتروني (شكل ١٥ ب) حيث تحاط الخلية من الخارج بالغمد الجيلاتيني وقد يكون متعدد الطبقات وملون .

ويعتبر السليولوز المكون الرئيسي للجزء الداخلي منه وتظهر لوبيفات السليولوز بشكل شبكي اما الجزء الخارجي فيحتوي مواد بكتينية

اما الجدار الخلوي الذي يقع الى داخل الغمد فيتكون عادة من اربع طبقات وتكون مكوناته من مركبات ميوكوببتيدية Mucopeptide component ومكونة من عدة احماض امينية منها Alanine و Muramic acid ، الجزء المحيطي من البروتوبلاست يحوي على صفائح البناء الضوئي المفردة والمؤلفة من غشائين يفصل بينهما مسافة صغيرة وتتركز عليها الحبيبات الصبغية ( وهي عبارة عن صبغات البليوبروتينات الخضراء المزرقة والحمراء والتي هي Phycobilosoms

عبارة عن صبغة + بروتين) ولا تحاط صفات البناء الضوئي بغشاء كما في بقية الطحالب التي تحوي بلاستيدات محددة اما المادة النووية Centroplast فتظهر بشكل مادة حبيبية عديمة اللون وهي عبارة عن لويبيفات من مادة DNA وقد يظهر بشكل شبكة ويفتقـر الى DNA الى وجود بروتين الهيستون .

يحيـي البروتوبلاست ايضا على :

- ١- الـ ribosomes المنتشرة في السايتوبلازم لعدم وجود الشبكة الاندوبلازمية .
- ٢- حبيبات النشا السـيـانـوفـايـسـينـي Cyanophycean starch وهو عبارة عن بوليمرات من الـ Aspartic acid والـ Arginine . (تعريف)
- ٣- Polyposphate bodies وهي عبارة عن مركبات فوسفاتية متعددة مرتبطة مع البروتين وتظهر بشكل تراكيـب عصـويـة . (تعريف)
- ٤- Polyhedral bodies وهي عبارة عن اجسام متعددة الاـضـلاـع يعتقد انها تحـوي انـزـيمـات الـبـنـاءـالـضـوـئـيـ الـخـلـيـةـ فيـبعـضـالـانـوـاعـالـهـائـمـةـ تـحـويـ الخـلـيـةـ عـلـىـ الفـجـوـاتـ الغـازـيـةـ اوـ الفـجـوـاتـ الكـاذـبـةـ وـالـتـيـ تـظـهـرـ تـحـتـ القـوـةـ الصـغـرـىـ للمـجـهـرـ بـالـلـوـنـ الاسـوـدـ وـتـحـتـ القـوـةـ الكـبـرـىـ بـالـلـوـنـ الـاحـمـرـ وـتـظـهـرـ تحتـ المـجـهـرـ الـاـلـكـتـرـوـنـيـ بشـكـلـ حـوـيـصـلـاتـ اـسـطـوـانـيـةـ مجـوـفـةـ وـلـهـ نـهـاـيـاتـ قـمـعـيـةـ وـمـحـاطـةـ بـغـشـاءـ مـفـرـدـ وـتـكـوـنـ مـنـ بـرـوـتـينـ . (تعريف)

سـ/يعـقـدـ انـ ظـهـورـ واـخـفـاءـ هـذـهـ الفـجـوـاتـ يـعـودـ الىـ :

- ١- الضـغـطـ اوـ الفـرـاغـ الجـزـئـيـ .
- ٢- كما يـعـزـىـ ظـهـورـهـاـ الىـ نـقـصـانـ الاـوـكـسـجـينـ فيـ الخـلـيـةـ ماـ يـسـاعـدـ طـحـلـبـ عـلـىـ الطـفـوـ قـرـيبـ مـنـ السـطـحـ .
- ٣- وـيـعـقـدـ ايـضاـ انـهـ تـرـاكـيـبـ مـظـلـلـةـ لـحـبـيـبـاتـ الـبـنـاءـ الـضـوـئـيـ .

## الـحرـكـةـ : Motility

بالرغم من عدم احتواء افراد الشعبـةـ عـلـىـ اـسـوـاطـ اوـ الـاهـدـابـ الاـ انـهـ لـوـحـظـتـ نوعـ منـ الـحرـكـةـ التـرـحـلـقـيـةـ Gliding اوـ الـحرـكـةـ الزـاحـفـ Creeping لـبعـضـ الـانـوـاعـ الـخـيـطـيـةـ خـاصـةـ فيـ طـحـلـبـ Oscillatoria وـطـحـلـبـ Spirulina وـفيـ بـعـضـ الـانـوـاعـ الـمـتـجـمـعـةـ الـكـرـوـيـةـ ،ـ وـذـلـكـ عـنـ تـواـجـدـهـاـ عـلـىـ ايـ سـطـحـ صـلـبـ وـتـكـوـنـ الـحرـكـةـ اـمـاـ الـىـ الـامـامـ اوـ الـىـ الـخـلفـ .

تحـدـثـ الـحرـكـةـ اـمـاـ بـحـرـكـةـ نـهـاـيـةـ الـخـيـطـ حـرـكـةـ دـوـرـانـيـةـ اوـ حـرـكـةـ شـبـيـهـةـ بـحـرـكـةـ بـنـدـولـ السـاعـةـ ،ـ وـفـيـ الـحـالـتـيـنـ يـنـدـفـعـ جـسـمـ طـحـلـبـ اـمـاـ الـىـ الـامـامـ اوـ الـىـ الـخـلفـ ،ـ وـلـقـدـ فـسـرـتـ هـذـهـ الـحرـكـةـ عـلـىـ اـسـاسـ بـعـضـ الـاـفـرـاضـ وـهـيـ :

- ١- الـاـفـرـاضـ الـاـوـلـ : جـارـ الخـلـيـةـ يـحـيـ عـلـىـ ثـقـوبـ يـفـرـزـ عـبـرـ هـذـهـ الثـقـوبـ موـادـ جـلـاتـيـنـيـةـ مـنـ دـاخـلـ الخـلـيـةـ وـالـىـ السـطـحـ الـخـارـجـيـ لـجـسـمـ فـقـسـاـعـدـ فـيـ اـنـزـلـاقـ جـسـمـ طـحـلـبـ .
- ٢- الـاـفـرـاضـ الـثـانـيـ : انـ جـارـ الخـلـيـةـ يـحـيـ عـلـىـ لـبـيـفـاتـ دـقـيقـةـ بـتـقـلـصـ وـانـبـاطـ الـبـيـفـاتـ تـنـمـ حـرـكـةـ طـحـلـبـ .

## **ظاهرة التكيف اللوني (ظاهرة جايد كوف) (Giadkoff phenomenon )**

تتميز افراد هذه الشعيبة بقابليتها على الظهور باكثر من لون فقد تلاحظ باللون الاخضر المزرق او البني او الاسود ، وقد يعود السبب احيانا الى ان لون الغلاف الجيلاتيني المحاط بجسم الطحلب ، او الى وجود صبغات البيلوبيرتینات الخضراء المزرقة او الحمراء بكميات كبيرة داخل الخلايا .

فقد تزداد كمية الصبغة الخضراء المزرقة فيظهر الطحلب بلون اخضر مزرق او تزداد كمية الصبغة الحمراء فيظهر الطحلب باللون الاحمر .

وقد لاحظ العالم جايدكوف ان لعامل الاضاءة اثر كبير في ظهور او اختفاء هذه الصبغات حيث تزداد كمية الصبغة الحمراء وتقل الصبغة الخضراء المزرقة عندما تكون الاضاءة قليلة وتقل الصبغة الحمراء او تخفي وتزداد الصبغة الخضراء المزرقة عندما تكون الاضاءة شديدة .

### **التكاثر : Reproduction**

التكاثر الطحالب الخضراء المزرقة تكاثرا خضريا وتكاثرا لا جنسيا ، اما التكاثر الجنسي فلم يلاحظ في افراد هذه الشعيبة .

#### **١- التكاثر الخضري Vegetative reproduction :**

يحدث هذا النوع من التكاثر بطريقتين :

##### **أ- الانقسام الخلوي البسيط : Binaryfission**

في الانواع الاحادية الخلية تتكاثر بالانقسام البسيط للخلية وتكون خليتين جديدين وفي بعض الانواع قد تبقى الخلية المنقسمة داخل نفس الغشاء الجيلاتيني للخلية الام ، وقد تعاود هذه الانقسام مكونة تجمعات من الخلايا داخل نفس الغشاء الجيلاتيني كما في طحلب *Chroococcus* وطحلب *Gleocapsa* .

##### **ب- التجروف : Fragmentation**

في الانواع الخيطية قد تموت بعض الخلايا الخضراء البنية بسبب العمر او اي عامل بيئي اخر فتصبح افراص انفصال Separating لمجموعة الخلايا الخضراء التي تتحصر بين هذه الخلايا الميتة وتبتعد هذه الخلايا الحية عن جسم الطحلب الام وتحرك حركة تزحلقية واضحة ثم تبدأ بتكوين طحلب جديد ، ويطلق على هذه الخلايا بالهرمونوكونيا Hormogonia .

اما في الانواع التي تتكون بشكل مستعمرات فقد تتجزأ بعض خلايا المستعمرة لتبدأ بتكوين مستعمرات جديدة .

## - التكاثر اللاجنسي : Asexual reproduction

يحدث هذا النوع من التكاثر بتكوين خلايا او ابواغ غير متحركة وكما يأتي :

### اولاً: الخلية الساكنة : Akinete

هي عبارة عن خلية خضرية تكبر في الحجم وتمثل بحببيات الغذاء المخزون Cyanophycean granules وتحتوي على كمية كبيرة من DNA وتحيط نفسها بجدار سميك وقد يكون ملون ولها القابلية على البقاء لفترة طويلة محتفظة بحيويتها قبل الانبات وتكوين طحلب جديد او قد تقسم محتوياتها لتكون مجموعة من الا ابواغ ينمو كل منها الى طحلب جديد (شكل ١٦ ب) تلاحظ في طحلب *Mabaena* وبعض الانواع الخيطية الاخرى .

### ثانياً :الحو يصلة المغایرة : Heterocysts

هي خلية خضرية محورة محاطة بجدار ثلاثي الطبقات ومحتوياتها متجانسة وخالية من حببيات الغذاء المخزون وتحتوي كلوروفيل a وتفتقر الى وجود صبغات البليوبروتينات ولها عقدة او عقدتين قطبية تمثل مناطق اتصالها بالخلايا المجاورة وقد تكون هذه الخلية اما طرفية Terminal او قاعدية Basale او قد تكون قمية Apical او تكون بينية Intercalary . (شكل ١٦ ب)

### وظائف خلية الحوصلة المغایرة :

يعتقد ان لهذه الخلية اكثرا من وظيفة :

- ١ - تمثل هذه الخلية وسيلة للتكاثر حيث تمثل مناطق انفصال للخلايا الخضرية (الهرمونات ) والتي تنفصل عن الطحلب الام لتكون طحلب جديد .
- ٢ - يعتقد البعض انها تمثل اعضاء تكاثرية مختزلة حيث اثبتت الدراسات ان لهذه الخلية القدرة على الانبات وتكوين طحلب جديد (تحت ظروف مختبرية )
- ٣ - ان احتواء الحوصلة المغایرة على انزيم Nitrogenase يثبت ان لهذه الخلية القدرة على تثبيت النيتروجين الجوي .

٤ - وجود الخلية الساكنة Akinete قريبة من هذه الخلية يجعل البعض يعتقد ان الحوصلة المغایرة تحت على تكوين الخلايا الساكنة .

٥ - وجود هذه الخلية في منطقة التفرعات الكاذبة في بعض الاجناس يجعل البعض يعتقد ان للحوصلة المغایرة علاقة بحدوث هذا النوع من التفرع .

### ثالثاً: الابواغ الخارجية : Exospores

في بعض انواع الطحالب مثل طحلب *Chamaesiphon* يتكون نوع من الابواغ اللاجنسيه الخارجية والتي تنشأ بتخصـر قمة الجدار الخلوي للخلية الام وانفالـه بشـكل تركـيب كروـي مع جـزء من مـحتويـاتـ الـخلـيـةـ الـامـ وـقدـ تـبـقـىـ هـذـهـ الـابـوـاغـ مـتـصـلـةـ بـالـخـلـيـةـ الـامـ لـتـكـونـ سـلـسلـةـ مـتـلـاصـقـةـ تـسـقطـ بـعـدـ هـاـ وـيـنـموـ كـلـ مـنـهـاـ إـلـىـ طـحـلـبـ جـديـدـ (ـشـكـلـ ١٦ـ جـ )

#### **رابعاً : الابواغ الداخلية : Endospores**

ت تكون هذه الابواغ بانقسام بروتوبلاست الخلية مع المادة النووية الى جزئين او اكثر تتحرر  
بعدها لتنمو الى طحالب جديدة مثل طحلب *Dermocarpa* (شكل ١٦ د)

#### **خامساً : الابواغ او الاكياس الصغيرة : Nannocystes or Nannospores**

في بعض الاجناس مثل طحلب *Gleocapsa* او طحلب *Microcystis* ونتيجة لتوفر الظروف  
البيئية الملائمة يحدث انقسام الخلية البسيط بشكل سريع ومتكرر فت تكون خلايا اصغر من الخلايا الام  
تدعى Nannocystes او Nannospores تكبر بعدها بالحجم لتكون طحلب يشابه الطحلب الام .

#### **سادساً : ابواغ او اكياس Hormosporales او Hormocystes**

في بعض الاجناس قد تحيط مجموعة من الخلايا الخضراء الطرفية نفسها بجدار سميك لكون  
الظروف البيئية غير ملائمة للطحلب وتبقى محتفظة بحياتها لحين توفر الظروف الملائمة لتنمو الى  
طحلب جديد يطلق على هذه الخلايا بالـ Hormosporales او Hormocysts .

### **تصنيف الطحالب الخضر المزرقة :**

صنفت افراد هذه الشعبة تحت صف واحد (Class Cyanophyceae) ويضم هذا الصف ٥  
رتب وصنفت على اساس التركيب والشكل الخضري والبيئة والتواجد وطرق التكاثر وهذا التصنيف  
من قبل كثير من العلماء

#### **1 – Order Chamaesiphonales**

تضم اجناس :

- تتوارد غالبيتها في المياه المالحة والبعض منها في المياه العذبة .
- تنمو ملتصقة على الصخور او على النباتات او على طحالب خيطية او متطفلة .
- تضم اجناس احادية الخلية مثل *Chamaesiphon* او بشكل تجمعات خلوية مثل طحلب *Dermocarpa*
- تتكاثر بتكون ابواغ خارجية Exospores وابواغ داخلية Endospores .

#### **2 – Order Chroococcales**

تضم اجناس :

- ١ – تتوارد في المياه العذبة والمويلة والمالحة .
- ٢ – تنمو بصورة هائلة وقد يسبب البعض ظاهرة ازدهار الماء Water bloom او تنمو ملتصقة على الصخور .
- ٣ – بعض الانواع مثل *Merismopedia* تعتبر دليلاً لتلوث للمياه العراقية بالمواد العضوية .

٤ – تضم اجناس احادية الخلية او مستعمرات منتظمة او غير منتظمة او تجمعيات للخلايا ويحاط جسمها بغلاف جيلاتيني شفاف او سميك وملون .

٥ – تتكاثر بالانقسام الخلوي البسيط او التجزؤ او بتكون الـ Nannospores ، مثال عليها *Merismopedia Chroococcus , Gleoecapsa*

ملاحظة: شرح الاجناس في العلمي .

### 3 – Order Pleurocapsales

تضم هذه الرتبة:

١ – عدد قليل من الاجناس

٢ – تنمو ملتصقة على الصخور او الطين او على النباتات المائية وقد ينمو البعض منها داخل الشقوق الصخرية .

٣ – تضم اجناس ذات شكل خضري مختلف الشعيرات Heterotrichous حيث تتكون بشكل كتل من الخلايا وتنتج عادة من الانقسام الخلوي باتجاه واحد او اتجاهين .

٤ – تتكاثر بتكون اعداد كبيرة من الابواغ الداخلية داخل بعض الخلايا الخضرية مثال عليها طحلب (شكل ١٧ (٢)) *Hyella*

### 4 – Order Nostocales

تضم اجناس:

١ – تتواجد في المياه العذبة والمويلة والمالحة ، اما بصورة هائمة وقد يتسبب بعض الانواع ظاهرة ازدهار الماء او تنمو ملتصقة على الطين او الصخور او الرمال ، كما يتواجد البعض منها على اليابسة على الصخور الرطبة وجدران الابار والكهوف الرطبة .

٢ – تضم هذه الرتبة اكبر عدد للاجناس العائدة لهذه الشعبة وتكون ذات اشكال خيطية مستقيمة او حلزونية الشكل او ذات نفرع كاذب او قد تتشعع بشكل خيوط داخل غمد جيلاتيني فتكون بشكل مستعمرات منتظمة او غير منتظمة

٣ – تتكاثر اما بتكون الهرموكونيا Hormogonia ، او بتكون الحويصلات المغایرة او الخلايا الساكنة ،

٤ – من الامثلة على هذه *Rivularia , Spirulina , Oscillatoria , Anabaena , Nostoc* ، (شكل ١٧ ، ٣) *Scytonema*.

### 5 – Order Stigonematales

تضم اجناس:

- ١ - تتوارد بصورة ملتصقة على الصخور او الرمال .
- ٢ - تضم عدد قليل من الاجناس ذات الشكل الخطي ذو التفرع الحقيقي وقد يكون خيوط منبطة وآخرى قائمة وقد يكون الخيط مؤلف من صف من الخلايا وتحوي الخيوط على الحويصلة المغيرة .
- ٣ - تتكاثر بتكون الهرموكونيا Hormogonia مثل طحلب الـ Stigonema (شكل ٤-١٧)